

Annexe 2



CONSEILS sur les Mesures Barrières en Ophtalmologie

Patients	Secrétariat	Salle d'attente	Ophtalmologiste (et orthoptiste, IDE)	Unité de consultation et examens complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> • Prévenu que vient avec : <ul style="list-style-type: none"> • Masque si possible • Son stylo + CB à préférer • Reporter + appel MT / 15 si: fièvre, toux, courbature, diarrhée, anosmie-aguesie • Accompagnant reste dehors (sauf enfant ou handicapé) • Masque chirurgical si COVID + ou FDR • Sinon masque ou protection personnelle a minima • SHA ou lavage des mains à l'entrée 	<ul style="list-style-type: none"> • Accueil au moins à 1 m (si besoin marquage au sol) • Hygiaphone ou panneau de plexiglas si compatible avec la configuration des lieux • Masque ou visière couvrant le visage • SHA entre chaque patient • Pas de prêt de stylo • Si règlement à gérer <ul style="list-style-type: none"> • Espèces : gants jetables • CB : film plastique sur boitier ou sans contact 	<ul style="list-style-type: none"> • Espacer les sièges d'au moins 1 m (Condamner ou supprimer des sièges, si besoin marquage au sol) ou cloison de plexiglas • Éviter le face à face patients • Suppression des revues, journaux et jouets • Désinfecter sièges et poignées de porte après chaque vacation • Contrôler climatisation (Eviter si par air recyclé) • Aérer les pièces • Toilettes : désinfection régulière (lingettes antiseptiques) + sac poubelle refermable et lavage des mains 	<ul style="list-style-type: none"> • Masque FFP2 si possible sinon chirurgical • +/- Lunettes de protection • SHA ou lavage des mains entre chaque patient (Sèches-mains, mouchoirs jetables) • Si patient COVID + : <ul style="list-style-type: none"> • Masque FFP2 requis • Lunettes • Gants jetables • Surblouse ou tablier plastique ou casaque chirurgicale • Protège-chaussures • Retrait sans toucher l'extérieur de tout ce qui fait face ou a été en contact avec le patient 	<ul style="list-style-type: none"> • Désinfection entre chaque passage • Siège et accoudoirs • Surfaces • Clavier et souris • LAF et machines : oculaires, palonnier et mentionnière • Écran LAF (plexiglass ou feuille plastique) • Limiter la climatisation • Aérer les pièces • Poubelle avec sac refermable
Facteurs de Risque de COVID <ul style="list-style-type: none"> • Age > 70 ans • Maladies CV ou respiratoires (BPCO, mucoviscidose) • Immunodéprimé • Cancer, hémopathie, cirrhose • Grossesse (à tout stade) • Obésité, diabète • Insuffisance rénale • Prise AINS dans les 5j, AIS au long cours 		Gestion du masque <ul style="list-style-type: none"> • Appui à la racine du nez • Couvre le visage • Test d'étanchéité + si FFP2 • Ne pas se toucher le visage lorsque l'on porte un masque • Enlever le masque par les élastiques • Si possible, changement si humide ou toutes les 4h si chirurgical ou toutes les 8h si FFP2 • Avant et après le masque, lavage des mains ou SHA • Si lavable, 30 min à 60° + sèche-linge 		Au total : reprise d'activité possible si <ul style="list-style-type: none"> • Respect de ces conditions d'hygiène et de protection • Diminution et étalement des flux • Limitation à l'urgence, aux suivis et traitements prioritaires au moins jusqu'au 11 mai 2020 • Ces conseils ne se substituent pas aux recommandations des autorités sanitaires (évolutives)

Annexe 3

Interrogatoire préopératoire par téléphone ou télémedecine

Recherche de signes d'alerte COVID (si oui, depuis quand ?)

- Toussez-vous ?
- Avez-vous de la fièvre, ou sensation de chaud-froid ?
- Ressentez-vous des courbatures, douleurs musculaires ?
- Vous sentez-vous anormalement fatigué ?
- Avez-vous perdu le goût et/ou l'odorat ?
- Présentez-vous un écoulement nasal ?
- Ressentez-vous une gêne respiratoire ?
- Présentez-vous une gêne et/ou rougeur et/ou sécrétion oculaires ?
- Présentez-vous des engelures aux doigts (rougeur, gonflement, cloques) ?
- Avez-vous été en contact avec une personne COVID ?

Si 1 ou plusieurs signes :

- Différer la chirurgie (sauf urgence = bloc COVID +)
- Avis du Médecin traitant
- Ou appel du 15